

室田 一雄：「離散凸解析」 共立出版 の訂正と補足

誤り等を見つけた方はお知らせくだされば有難く存じます。

初版 (第 1 ~ 4 刷) の共通項目

- 80 頁 -1 行, 命題 3.6 の証明の最後

「(B-EXC₊[Z]) の対偶により」という書き方が分かりにくいという指摘がありました。 「 $y \in B, y + \chi_{u_*} - \chi_v \notin B, y + \chi_{u_*} - \chi_{v_0} \notin B$ なので, $y'' \in B$ だとすると (B-EXC₊[Z]) に矛盾する」と書いた方が分かりよかったですかもしれません。

- 91 頁: 定理 3.17(2) の証明では次の命題を用いている。

命題: P を有理多面体 ($\subseteq \mathbf{R}^n$) とするとき, P のすべての極小面が整数ベクトルを含むならば, P に含まれる整数ベクトルの凸包 $P_1 = \overline{P \cap \mathbf{Z}^n}$ は P に一致する。

以下, 補足説明を与える。この命題において, 有理多面体という条件は必要である。例えば, $P = \{(x_1, x_2) \mid x_1 - \sqrt{2}x_2 \geq 0\}$ とすると, P は唯一の極小面 $F = \{(x_1, x_2) \mid x_1 - \sqrt{2}x_2 = 0\}$ をもち, F は整数ベクトル $(0, 0)$ を含む。しかし, $P_1 = \{(0, 0)\} \cup \{(x_1, x_2) \mid x_1 - \sqrt{2}x_2 > 0\}$ となり, P に一致しない (そもそも P_1 は多面体ですらない)。

一方, P が有理多面体のときには, P_1 は多面体になることが知られている。また, 任意のベクトル $c \in \mathbf{R}^n$ に対して,

$$\max\{\langle c, x \mid x \in P_1\} \text{ が有界} \implies \max\{\langle c, x \mid x \in P\} \text{ が有界} \quad (\text{E1})$$

が成り立つ。なお, この二つの事実については, B. Korte and J. Vygen: *Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms*, Springer-Verlag, Berlin, 2000; 3rd ed., 2006; 4th ed., 2008, の Theorem 5.7 と Proposition 5.1 に証明とともに記述があります。

命題の証明 背理法で証明するために, 仮に P_1 が P に一致しないとすると, ある $y \in P \setminus P_1$ が存在する。このとき, あるベクトル $a \in \mathbf{R}^n$ と実数 β が存在して, $\langle a, y \rangle > \beta$ かつ $\langle a, x \rangle \leq \beta (\forall x \in P_1)$ が成り立つ。[細かいことを言えば, (a, β) の存在を主張する際に, P_1 が多面体 (したがって閉集合) であることを使っている。] したがって,

$$\max\{\langle a, x \mid x \in P\} \geq \langle a, y \rangle > \beta, \quad \max\{\langle a, x \mid x \in P_1\} \leq \beta \quad (\text{E2})$$

である。式 (E1) より, 線形計画問題

$$\max\{\langle a, x \mid x \in P\}$$

は有界であるから, 最適解をもつ。最適解の全体 F は P の面を成すので, 仮定より, F は整数ベクトルを含む (F に含まれる極小面が整数ベクトルを含むから)。しかし, これは式 (E2) に矛盾する。これで, 命題の証明ができたことになる。

- 118 頁 定理 4.8 (8) [M 凸関数の合成積が M 凸関数であること]
 ここではネットワークによる変換を利用した証明になっていますが、より直接的な証明が K. Murota: On infimal convolution of M-convex functions, 京都大学数理解析研究所 講究録, No.1371 (2004), 20–26,
<http://www.keisu.t.u-tokyo.ac.jp/research/techrep/data/2004/METR04-12.pdf>
 にあります。

- 121 頁 補足 4.14
 条件 (4.41) は冗長で、条件 (4.40) から導かれます。

- 137 頁 補足 4.42
 [整多面体的 M 凸関数 $f \in \mathcal{M}[\mathbf{Z}|\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}]$ に対しては $\alpha_0 = 1$ とできる] の証明。
 任意の $x, y \in \text{dom } f$ と $u \in \text{supp}^+(x - y)$ に対して、ある $v \in \text{supp}^-(x - y)$ が存在して、十分小さなすべての $\alpha > 0$ に対して、不等式

$$f(x) + f(y) \geq f(x - \alpha(\chi_u - \chi_v)) + f(y + \alpha(\chi_u - \chi_v)) \quad (4.61)$$

が成り立つ。定義域 $\text{dom } f$ は f が線形 (アフィン) であるような領域に分割されているが、それらの領域はすべて整数基多面体である。十分小さな $\hat{\alpha} > 0$ に対して、 $\hat{x} \equiv x - \hat{\alpha}(\chi_u - \chi_v)$ を相対的内点とする最小の基多面体を B_x とし、 $\hat{y} \equiv y + \hat{\alpha}(\chi_u - \chi_v)$ を相対的内点とする最小の基多面体を B_y とする。 B_x, B_y はともに整基多面体であり、整基多面体においては交換容量 (exchange capacity) は整数だから [Fujishige [40] の (2.38) 式参照], $x - \hat{\alpha}(\chi_u - \chi_v) \in B_x$ より $x' \equiv x - (\chi_u - \chi_v) \in B_x$ が導かれ、 $y + \hat{\alpha}(\chi_u - \chi_v) \in B_y$ より $y' \equiv y + (\chi_u - \chi_v) \in B_y$ が導かれる。 f は B_x, B_y のそれぞれの上で線形だから $x - \beta(\chi_u - \chi_v) \in B_x, y + \beta(\chi_u - \chi_v) \in B_y$ である任意の β に対して

$$\begin{aligned} f(x - \beta(\chi_u - \chi_v)) - f(x) &= (\beta/\hat{\alpha})[f(x - \hat{\alpha}(\chi_u - \chi_v)) - f(x)], \\ f(y + \beta(\chi_u - \chi_v)) - f(y) &= (\beta/\hat{\alpha})[f(y + \hat{\alpha}(\chi_u - \chi_v)) - f(y)]. \end{aligned}$$

ここで $\beta = 1$ として両者を加えると

$$f(x') + f(y') - f(x) - f(y) = (1/\hat{\alpha})[f(\hat{x}) + f(\hat{y}) - f(x) - f(y)]$$

となるが、この右辺は (4.61) で $\alpha = \hat{\alpha}$ としたものであるから、右辺 ≤ 0 。したがって (4.61) が $\alpha = 1$ で成り立つ。

- 152 頁 定理 5.12 (L 凸関数最小性規準)
 ここでは整凸関数の最小性規準を利用した証明になっていますが、より直接的な証明が K: Murota: A proof of the L-optimality criterion theorem, unpublished note, July 2004, <http://www.comp.tmu.ac.jp/kzmurota/paper/loptimality04.pdf>
 にあります。

- 155 頁 定理 5.16 (L 凸関数の凸拡張) の証明の解説: 証明中 (156 頁) の

この構成法から h は各 $p \in \mathbf{Z}^V$ に対して単位超立方体 $[p, p + \mathbf{1}]_{\mathbf{R}}$ 上で凸関数であるが, 実は, \mathbf{R}^V 全域で凸である. なぜなら, (5.2) から

$$h(q - \alpha \mathbf{1}) = h(q) - \alpha r \quad (q \in \mathbf{R}^V, \alpha \in \mathbf{R}) \quad (5.24)$$

が成り立ち, 各 $q \in \mathbf{R}^V$ に対して, ある $\alpha \in \mathbf{R}$ と $p \in \mathbf{Z}^V$ が存在して, $q - \alpha \mathbf{1}$ は $[p, p + \mathbf{1}]_{\mathbf{R}}$ の内点となるからである.

について論理の詳細を説明します. 基本となる事実は, 「凸集合上で定義された (連続変数の) 関数の凸性は局所凸性と同値」という事実で, これを関数 h に適用しています. まず, 関数 h の実効定義域は L 凸多面体になるので, 凸集合であることに注意します. したがって,

命題 A: 任意の $q \in \mathbf{R}^V$ に対して, q のある凸開近傍 W が存在して, 関数 h は W 上で凸である

を示せば, h の凸性が証明されます. 証明中に書いてあるように,

(LOV) h は各单位超立方体の内部では (劣モジュラ関数の Lovász 拡張だから) 凸関数,

(BND) h は各单位超立方体の境界では連続 (well-defined)


です. したがって, 命題 A における q が単位超立方体の境界にある場合が問題となります.

命題 A の証明

q の十分小さい開近傍

$$W = \{t \in \mathbf{R}^V \mid \|t - q\|_{\infty} < \varepsilon\}$$

を考える (ただし, ε は十分小さい正の数).



$\alpha = 2\varepsilon$ とおくと, $W_{\alpha} = W - \alpha \mathbf{1}$ は, 一つの単位超立方体の内部にある. したがって, (LOV) により, h は W_{α} 上で凸関数である. 一方, (5.24) より

$$h(t) = h(t - \alpha \mathbf{1}) + \alpha r \quad (t \in W)$$

である. $t \in W$ のとき $t - \alpha \mathbf{1} \in W_\alpha$ であるから, h は W 上で凸である (αr は定数なので凸性には影響しない).

- 186 頁 定理 6.14 (M 凸交わり定理)
ここでは M 分離定理を利用した証明になっていますが, より直接的な証明が K. Murota: A proof of the M-convex intersection theorem, 京都大学数理解析研究所 講究録, No.1371 (2004), 13–19,
<http://www.keisu.t.u-tokyo.ac.jp/research/techrep/data/2004/METR04-03.pdf>
にあります.
- 270 頁 「 \tilde{U} の強非補完性 (SNC) $\implies U$ の M^\natural 凹性」
この命題の逆も成立すること, すなわち

$$\tilde{U} \text{ の強非補完性 (SNC) } \iff U \text{ の } M^\natural \text{ 凹性}$$

が成り立つことが示されています : K. Murota: Multiple exchange property for M^\natural -concave functions and valuated matroids, arXiv: 1608.07021, August, 2016.
<http://arxiv.org/abs/1608.07021>

以下、初版 1 刷 (2001)～3 刷 (2010) に該当する項目 (4 刷 (2015) では訂正済)

- 20 頁 18 行
誤: $f'(x; \cdot) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R} \cup \{+\infty\} \implies$ 正: $f'(x; \cdot) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$

- 91 頁 2 行 (定理 3.17(1) の証明中)
誤: \tilde{y} も整数ベクトルである.
 \implies 正: 整数ベクトルの最適解 \tilde{y} が存在する.

なお、最適解の全体に含まれる任意の極小面に着目すると、その中に \tilde{y} が存在することが分かります.

- 91 頁 8～13 行: 定理 3.17(2) の証明に不備があることを九州大学 川崎英文教授にご指摘頂きました. 下の証明に入れ替えてください.

\implies

(2) 問題 (A) の実行可能領域の極小な面 F に着目し, F が最適解の全体に一致する $p \in \mathbf{Z}^V$ を考える. 縦ベクトル $\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2$ を $\tilde{\rho}_i = (\rho_i(X) \mid X \in \mathcal{T}_i)$ ($i = 1, 2$) と定義し, $\tilde{\rho} = \begin{pmatrix} \tilde{\rho}_1 \\ \tilde{\rho}_2 \end{pmatrix}$ とおく. 線形計画の相補性 (定理 2.12(3)) により, 問題 (A) の実行可能解 x が最適解であるためには $Ax = \tilde{\rho}$ を満たすことが必要十分である. このことと F が極小面 (したがってアフィン部分空間) であることにより, $F = \{x \in \mathbf{R}^V \mid Ax = \tilde{\rho}\}$ となる. 係数行列 A は完全単模であるから, $\tilde{\rho}$ が整数ベクトルならば $Ax = \tilde{\rho}$ を満たす整数ベクトル x が存在する. すなわち, F は整数ベクトルを含む. 一般に, 有理多面体 (有理数係数の不等式で記述される多面体) のすべての極小面が整数ベクトルを含むならば, その多面体に含まれる整数ベクトルの凸包は元の多面体に一致する ([132] A. Schrijver: *Theory of Linear and Integer Programming*, 1986 の 16.3 節参照). したがって, (2) が成り立つ.

上に述べた基本事実を命題として述べ, 説明を追加する.

命題: P を有理多面体 ($\subseteq \mathbf{R}^n$) とするとき, P のすべての極小面が整数ベクトルを含むならば, P に含まれる整数ベクトルの凸包 $P_1 = \overline{P \cap \mathbf{Z}^n}$ は P に一致する.

ここで有理多面体という条件は必要である. 例えば, $P = \{(x_1, x_2) \mid x_1 - \sqrt{2}x_2 \geq 0\}$ とすると, P は唯一の極小面 $F = \{(x_1, x_2) \mid x_1 - \sqrt{2}x_2 = 0\}$ をもち, F は整数ベクトル $(0, 0)$ を含む. しかし, $P_1 = \{(0, 0)\} \cup \{(x_1, x_2) \mid x_1 - \sqrt{2}x_2 > 0\}$ となり, P に一致しない (そもそも P_1 は多面体ですらない).

一方, P が有理多面体のときには, P_1 は多面体になることが知られている. また, 任意のベクトル $c \in \mathbf{R}^n$ に対して,

$$\max\{\langle c, x \rangle \mid x \in P_1\} \text{ が有界} \implies \max\{\langle c, x \rangle \mid x \in P\} \text{ が有界} \quad (\text{E1})$$

が成り立つ。なお、この二つの事実については、B. Korte and J. Vygen: *Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms*, Springer-Verlag, Berlin, 2000; 3rd ed., 2006; 4th ed., 2008, の Theorem 5.7 と Proposition 5.1 に証明とともに記述があります。

命題の証明 背理法で証明するために、仮に P_1 が P に一致しないとすると、ある $y \in P \setminus P_1$ が存在する。このとき、あるベクトル $a \in \mathbf{R}^n$ と実数 β が存在して、 $\langle a, y \rangle > \beta$ かつ $\langle a, x \rangle \leq \beta$ ($\forall x \in P_1$) が成り立つ。[細かいことを言えば、 (a, β) の存在を主張する際に、 P_1 が多面体（したがって閉集合）であることを使っている.] したがって、

$$\max\{\langle a, x \rangle \mid x \in P\} \geq \langle a, y \rangle > \beta, \quad \max\{\langle a, x \rangle \mid x \in P_1\} \leq \beta \quad (\text{E2})$$

である。式 (E1) より、線形計画問題

$$\max\{\langle a, x \rangle \mid x \in P\}$$

は有界であるから、最適解をもつ。最適解の全体 F は P の面を成すので、仮定より、 F は整数ベクトルを含む (F に含まれる極小面が整数ベクトルを含むから)。しかし、これは式 (E2) に矛盾する。これで、命題の証明ができたことになる。

- 奥付 著者紹介 著書
「数値計算法の整理」 \implies 「数値計算法の数理」

以下, 初版 1 刷 (2001), 2 刷 (2003) に該当する項目 (3 刷 (2010) 以降では訂正済)

- 82 頁 7 行 誤: $4 \min(\lambda_j, \lambda_k)$ \implies 正: $2 \min(\lambda_j, \lambda_k)$
- 82 頁 9 行 誤: $4/N$ \implies 正: $2/N$
- 126 頁 定理 4.20 の証明
 \bar{B} が M 凸多面体であることから, B が M 凸集合であることを導くには, B に穴がないことを示しておく必要がある (多少面倒であるが, それは可能である).
- 233 頁 9 行 誤: $D_u = \{v \in V \mid (u, v) \in A_x\}$ \implies 正: $D_u = \{v \in V \mid (v, u) \in A_x\}$
- 284 頁 [40] 追加情報: 2nd ed., *Annals of Discrete Mathematics*, **58**, Elsevier, 2005.
- 284 頁 [41] to appear. \implies 280 (2004), 13–27.
- 284 頁 [44] to appear. \implies 28 (2003), 463–469.
- 287 頁 [73] to appear. \implies 131 (2003), 433–448.
- 289 頁 [109] to appear. \implies 131 (2003), 467–494.
- 290 頁 [110] RIMS Preprint 1326, Kyoto University, July 2001.
 \implies *Advances in Applied Mathematics*, **33** (2004), 318–341.
- 290 頁 [112] to appear. \implies 131 (2003), 495–512.
- 290 頁 [113] to appear. \implies 20 (2003), 257–277.
- 293 頁 [153] RIMS Preprint 1401, Kyoto University, February 2003.
 \implies *Discrete Applied Mathematics*, **154** (2006), 950–970.
- 293 頁 [154] METR 2003-23, University of Tokyo, July, 2003.
 \implies *Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics*, **21** (2004), 391–403.
- 293 頁 [157] to appear. \implies 14 (2003), 699–707.
- 293 頁 [158] to appear. \implies 101 (2004), 415–433.
- 293 頁 [159] RIMS Preprint 1382, Kyoto University, October 2002.
 \implies *Discrete Optimization*, **2** (2005), 256–268.
- 293 頁 [160] to appear. \implies 134 (2003), 303–316.
- 294 頁 [162] 追加情報: *Mathematical Programming*, **102** (2005), 339–354.

以下、初版第1刷(2001)のみ該当する項目(第2刷(2003)以降では訂正済)

- 28頁6行 (2.45)の上:
誤: n 次元ベクトル $b \implies$ 正: m 次元ベクトル b
誤: m 次元ベクトル $c \implies$ 正: n 次元ベクトル c
- 53頁9, 10行 誤: $p, q \implies$ 正: \tilde{p}, \tilde{q}
- 53頁16行 誤: $g(\eta_{\vee}) + g(\eta_{\wedge}) \implies$ 正: $g(p \vee q) + g(p \wedge q)$
- 115頁5行 誤: (4.8) \implies 正: (4.9)
- 145頁 定理 5.1 $g \equiv +\infty$ も含める
- 177頁5行 脚注:
誤: $\partial_{\mathbf{R}}g(p_0)$ は整 M 凸多面体である \implies 正: $\partial_{\mathbf{R}}g(p_0)$ は整 M^{\natural} 凸多面体である
- 177頁8行 誤: 複合同順 \implies 正: 複号同順
- 195頁7行 命題 6.30 の証明: $\operatorname{argmin} = \operatorname{argmin} + \operatorname{argmin}$ が成り立つためには g_1, g_2 をうまく選んでおく必要がある. 詳しくは, A. Tamura: On convolution of L-convex functions, Optimization Methods and Software, 18 (2003), 231–245, あるいは A. Tamura: Deconvolution of an L_2 -convex function, RIMS Preprint 1369, Kyoto University, July 2002 を参照のこと.
- 196頁 定理 6.32: $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}$ 型の場合には, g_1, g_2 を取り直す必要がある. 詳しくは, A. Tamura: On convolution of L-convex functions, Optimization Methods and Software, 18 (2003), 231–245, あるいは A. Tamura: Deconvolution of an L_2 -convex function, RIMS Preprint 1369, Kyoto University, July 2002 を参照のこと.
- 197頁5行 定理 6.32 の証明の最後: 誤: $\mathcal{M}_0[\mathbf{Z}|\mathbf{R}] \implies$ 正: $\mathcal{M}_0^{\natural}[\mathbf{Z}|\mathbf{R}]$
- 204頁–6行 式 (7.27): $x(V) = 0$ が抜けている
- 216頁10行 式 (7.61) の3行目 誤: $\Delta f(x; v, u) \implies$ 正: $\Delta f(\partial\xi; v, u)$
- 239頁6行 誤: のアルゴリズムを \implies 正: のアルゴリズムの原形を
- 239頁–2行 L^{\natural} 凸関数 g の最小化 (降下法) の S2:
誤: $g(p) = g(p + \alpha\chi_X)$ ならば \implies 正: $g(p) \leq g(p + \alpha\chi_X)$ ならば
- 239頁–2行 L^{\natural} 凸関数 g の最小化 (降下法) の S3:
誤: $p := p + \chi_X \implies$ 正: $p := p + \alpha\chi_X$

- 250 頁 命題 8.13 の証明 (1)
 下から 3 行目 誤: (8.32) が保持される \implies 正: (8.32), (8.33) が保持される
 下から 2 行目 誤: (8.33) が保持される \implies 正: 条件が保持される
- 274 頁, 例 9.12 の直前の行 誤: 前節 \implies 正: 第 2 節
- 274 頁, 例 9.12 の 1 行目 誤: (前節) \implies 正: (第 2 節)
- 284 頁 [44] preprint, 2000. \implies Mathematics of Operations Research, 28 (2003), 463–469.
- 286 頁 [67] to appear. \implies 84 (2002), 203–212.
- 286 頁 [68] to appear. \implies 48 (2001), 761–777.
- 286 頁 [69] to appear. \implies 13 (2003), 204–211.
- 287 頁 [73] Discrete Mathematics and Systems Science Research Report, No. 00-10, Division of Systems Science, Osaka University, July 2000. \implies Discrete Applied Mathematics, 131 (2003), 433–448.
- 289 頁 [108] to appear. \implies 115 (2001), 151–176.
- 289 頁 [109] RIMS Preprint 1306, Kyoto University, December 2000. \implies Discrete Applied Mathematics, 131 (2003), 467–494.
- 290 頁 [113] Computation of competitive equilibria of indivisible commodities via M-convex submodular flow problem, RIMS Preprint 1316, Kyoto University, March 2001. \implies Application of M-convex submodular flow problem to mathematical economics, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 20 (2003), 257–277.
- 291 頁 [121] 鈴木 \implies 鈴木

(以上)